LE DOSSIER

Œdème maculaire diabétique

Prise en charge de l'œdème maculaire diabétique : synthèse

→ F. FAJNKUCHEN

Centre d'Imagerie et de Laser, PARIS.
Service d'Ophtalmologie,
Hôpital Avicenne, BOBIGNY.

→ B. WOLFF

Service d'Ophtalmologie,
Fondation A. de Rothschild, PARIS.

Le bilan général

<i>L'équilibre des facteurs de risque systémique (glycémie, tension artérielle, dyslipidémie...) a-t-il été optimisé ?</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ● En cas de déséquilibre récent des FDR systémiques ● Ou de patients peu ou mal suivis, avec mauvais équilibre chronique des FDR systémiques <p>Il n'y a pas d'urgence à traiter : le patient doit être référé à un spécialiste du diabète pour optimisation de la prise en charge. Un contrôle ophtalmologique 4 mois après sera réalisé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● En cas d'équilibre des FDR systémiques ● Ou de patients n'ayant pas atteint les valeurs recommandées malgré une prise en charge générale optimisée <p>Il n'y a pas lieu de reporter la prise en charge ophtalmologique.</p>

Le bilan ophtalmologique

<i>Quel bilan faut-il réaliser avant la prise en charge ophtalmologique ?</i>		
Acuité visuelle	OCT	Angiographie à la fluorescéine et rétino-graphies
<p>L'acuité visuelle avec la charte ETDRS est l'acuité visuelle de référence à réaliser.</p> <p>Il s'agit du type d'acuité visuelle le plus sensible pour apprécier les variations d'acuité visuelle qui vont guider le traitement.</p> <p>C'est la mesure la plus discriminante pour apprécier les acuités visuelles basses.</p>	<p>C'est l'examen de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour poser le diagnostic d'œdème maculaire; – pour en préciser la topographie; – pour apprécier l'évolution sous traitement. 	<p>L'AF permet d'éliminer une maculopathie ischémique.</p> <p>Cet examen permet par ailleurs de dresser un diagnostic lésionnel en identifiant micro-anévrysmes et zones de capillaropathie diffuse, mais la distinction entre forme focale et diffuse a actuellement une pertinence clinique et thérapeutique discutée.</p>

Situation n° 1

L'OCT révèle un syndrome de traction vitréo-maculaire :

Un avis chirurgical s'impose.

F. Fajnkuchen a déclaré être consultant pour Allergan et Novartis.

LE DOSSIER

Œdème maculaire diabétique

Situation n° 2

L'œdème maculaire est extracentral :

Une photocoagulation est proposée en 1^{re} intention à condition :

- de mettre en œuvre une technique rigoureuse sans risque à court ou long terme pour la fonction maculaire ;
- et de ne mettre aucun impact dans une zone “sanctuaire” d’une surface papillaire centrée par la macula.

Situation n° 3

L'œdème maculaire est central :

On propose des injections intravitréennes d’anti-VEGF en première intention, à condition que :

- l’acuité visuelle soit inférieure ou égale à 5/10 ;
- le patient ne soit pas, ou plus, éligible à un traitement par laser ;
- le patient soit susceptible d’avoir un suivi mensuel.

Les **corticoïdes** injectables hors AMM sont proposés en cas :

- de contre-indications aux anti-VEGF ;
- d’échec des anti-VEGF ;
- d’impossibilité de suivi mensuel.