

PHOTO DU MOIS

Evolution d'une chorioretinite toxoplasmique maculaire par rétinoscopes et OCT stratus : analyse

E. CHAMPION¹, C. PARC¹, B. BODAGHI², V.P. KAHN¹

¹ Hôpital Foch, SURESNES. ² Hôpital Pitié Salpêtrière, PARIS.

Une baisse d'acuité visuelle de l'œil droit est survenue chez un patient de 61 ans dans les suites d'un remplacement de valve aortique. Découverte d'un foyer choriophtinien maculaire de l'œil droit.

L'analyse par PCR [1] de l'humeur aqueuse a confirmé l'origine toxoplasmique.

Sous traitement antiparasitaire et corticothérapie par voie générale, l'évolution du foyer maculaire a été surveillée par des rétinoscopes et l'OCT stratus.

AU STADE INITIAL

FIG. 1: Foyer choriophtinien actif.

FIG. 2: Epaississement rétinien global en OCT.

APRÈS 1 MOIS DE TRAITEMENT


FIG. 3: Stade de fragmentation du foyer.

FIG. 4: Apparition d'un pseudo-décollement séreux rétinien (pseudo-DSR) avec interruption de la ligne des photorécepteurs.

APRÈS 2 MOIS DE TRAITEMENT

FIG. 5: Lésion maculaire cicatricielle et atrophique sans évolution vers une pigmentation.

FIG. 6: Amincissement fovéal avec diminution du pseudo-DSR.



Bibliographie

1. DE BOER JH, VERHAGEN C, BRUINENBERG M *et al.* Serologic and polymerase chain reaction analysis of intraocular fluids in the diagnostic of infectious uveitis. *Am J Ophthalmology*, 1996 ; 121 : 650-658.