I Toxicités médicamenteuses rétinienne

Toxicité rétinienne aux antirétroviraux

C. ROHART

Centre ophtalmologique d'imagerie et de laser (CIL) et Hôpital Cochin, PARIS.

La toxicité aux antirétroviraux concerne principalement deux molécules : le ritonavir (Norvir) et la didanosine (Videx), utilisées dans le traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le **ritonavir** est une antiprotéase. La physiopathologie est mal connue et peu de cas de toxicité ont été rapportés. La toxicité rétinienne survient après plus de dix-huit mois de traitement, et le plus souvent, une insuffisance hépatique est associée. Roe *et al.* ont rapporté le premier cas en 2011 [1]. Une réversibilité partielle de l'atteinte est possible. Les patients sont asymptomatiques au stade précoce puis il peut y avoir une baisse d'acuité visuelle bilatérale [2]. En imagerie multimodale, trois stades sont décrits. Dans un premier temps, il existe des dépôts cristallins à l'aspect réfringent. Puis apparaissent des kystes intrarétiniens et des télangiectasies maculaires [3, 4]. Le stade ultérieur est l'atrophie chorio-rétinienne maculaire bilatérale, asymétrique et extensive. Le

Fig. 1 : Toxicité au ritonavir. Rétinophotographie de l'œil droit et gauche. Atrophie maculaire périfovolaire et cristaux maculaires.

Fig. 2 : Toxicité au ritonavir. Clichés infrarouge (en haut) et autofluorescence (en bas). Atrophie maculaire périfovolaire.

cliché en autofluorescence est l'examen de choix pour mieux visualiser les plages d'atrophie (*fig. 1 et 2*).

La **didanosine** (Videx) est un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (NRTI). Cette toxicité est secondaire à une toxicité mitochondriale [5]. Elle débute

par des altérations de l'épithélium pigmentaire en moyenne périphérie visibles au fond d'œil et en rétino-graphie grand champ. Une atrophie chorio-rétinienne en patch s'installe ensuite en moyenne périphérie et respecte la fovéa (*fig. 3*). Ces lésions sont rares mais peuvent apparaître rapidement après le début

Fig. 3 : Toxicité à la didanosine. Rétinophotographie de l'œil droit et gauche (**en haut**) et clichés en autofluorescence (**en bas**).

Atrophie en patch à tendance confluyente en moyenne périphérie, respectant la macula.

du traitement. Les patients sont asymptomatiques ou peuvent se plaindre d'héméralopie à des stades avancés. À l'arrêt du traitement, les atteintes se

stabilisent ou peuvent continuer de progresser [6]. Ces mécanismes toxiques semblent limités depuis l'avènement des NRTI de deuxième génération.

BIBLIOGRAPHIE

1. ROE RH, JUMPER JM, GUALINO V *et al.* Retinal pigment epitheliopathy, macular telangiectasis, and intraretinal crystal deposits in HIV-positive patients receiving ritonavir. *Retina*, 2011;31: 559-565.
2. BIANCARDI AL, CURI A *et al.* Retinal Toxicity Related to Long-term Use of Ritonavir. *Retina*, 2016;36:229-231.
3. NON L, JEROUDI A, SMITH BT *et al.* Bull's eye maculopathy in an HIV-positive patient receiving ritonavir. *Antivir Ther*, 2016;21:365-367.
4. BUNOD R, MIERE A, ZAMBROWSKI O *et al.* Ritonavir associated maculopathy - multimodal imaging and electrophysiology findings. *Am J Ophthalmol Case Rep*, 2020;22:19.
5. JOHARIY H, PISELLA PJ, AUDO I *et al.* A Rare Case of Didanosine-Induced Mid-Peripheral Chorioretinal Atrophy Identified Incidentally 11 Years after the Drug Cessation. *Medicina (Kaunas)*, 2022;58:735.
6. GABRIELIAN A *et al.* Didanosine associated retinal toxicity in adults infected with human immuno-deficiency virus. *JAMA Ophthalmol*, 2013;131:255-259.

L'auteure a déclaré ne pas avoir de liens d'intérêts concernant les données publiées dans cet article.