Revue de presse

Individualité : la nouvelle beauté

R. ABS
Chirurgien plasticien,
MARSEILLE.

Les “nez à la parisienne” ou “nez en piste de ski” étaient très demandés dans les années 1960-1970. Un dorsum évidé et une pointe retroussée assuraient le succès d’une esthétique standardisée. Au fil des ans, les critiques ont accusé ce concept qui encourage la conformité et ne reconnaît pas les différences individuelles.
Cependant, il n’est pas rare que des patients viennent dans nos cabinets à la recherche des fesses de Jennifer Lopez, des lèvres de Scarlett Johansson ou d’autres caractéristiques notables de personnes célèbres. Par ailleurs, internet a donné une plateforme de grande envergure à ceux qui osent être différents. La caissière de mon Super U a les cheveux verts. Elle n’est pas une adolescente, probablement bien au-delà de la vingtaine. Croit-elle vraiment que les cheveux verts la rendent plus attirante ? Mais alors, l’attractivité n’est pas la même chose que la beauté.
Nous en sommes venus à assimiler la beauté à l’humanité. Si nous ne voyons pas la beauté d’une personne, c’est que nous sommes aveugles à son humanité. La beauté est si importante aujourd’hui que refuser aux gens de la posséder équivaut à leur refuser de l’oxygène. La beauté est devenue politique : le surpoids est beau. Le vieux est beau. Les handicaps sont beaux.
C’est une focalisation sur l’individualité. Nos patients rejettent la notion d’un standard universel de beauté. Ils veulent simplement être une version plus attrayante d’eux-mêmes (Nahai F. Individuality: the new beauty. *Aesthet Surg J*, 2022;42:444-446).

Buttocks volume augmentation with submuscular implants: 100 cases series

Petit F, Colli M, Badiali V *et al. Plast Reconstr Surg*, 2022;149:615-622.

Une augmentation esthétique permanente de la région fessière peut être obtenue avec une greffe de graisse et/ou des implants. Les implants fessiers peuvent être placés dans quatre plans différents : sous-cutané, sous-fascial, intramusculaire et sous-musculaire. Dans cette analyse rétrospective, une série de 100 patients a bénéficié d’une glutéoplastie primaire réalisée avec une pose d’implants sous-musculaires. Les complications les plus fréquentes étaient le retard de cicatrisation de l’incision et le retournement de l’implant.

Le positionnement des implants en sous-musculaire est une technique sûre et fiable pour l’augmentation des fesses. Celle-ci présente l’avantage de recouvrir, protéger et dissimuler parfaitement l’implant, le rendant presque impalpable et invisible.

Fragmented fat transfer for massive weight loss gluteal contouring

Mendes FH, Viterbo F. *Plast Reconstr Surg*, 2022;149:624-627.

Une nouvelle technique de fragmentation récemment introduite a permis de convertir le tissu adipeux de la résection de tablier en greffe adipeuse viable à grande échelle, offrant un aperçu d’une alternative à la liposuccion traditionnelle.

Un hachoir à viande manuel en acier inoxydable a été utilisé (autoclavable). Le volume total moyen greffé en sous-cutané dans les fesses était de 720 mL (bilatéral), allant de 500 à 960 mL. Aucune complication fessière locale telle qu’un sérome, une infection, une nécrose graisseuse ou des nodulations sous-cutanées n’a été signalée. L’observation photographique des résultats postopératoires sur une période de suivi de 6 à 14 mois a montré une nette amélioration du contour du corps chez tous les patients, en particulier chez ceux

Revue de presse

chez qui le transfert de graisse était combiné avec des liftings circonférentiels du bas du corps.

Structural preservation rhinoplasty: a hybrid approach

Toriumi, DM, Kovacevic M, Kosins AM. *Plast Reconstr Surg*, 2022;149:1105-1120.

La rhinoplastie de préservation structurelle fusionne deux philosophies populaires de la rhinoplastie – la rhinoplastie de structure et la rhinoplastie de préservation – dans le but de maximiser les résultats pour le patient, l'esthétique et la fonction. Cela permet au chirurgien à la fois de préserver les attributs favorables du nez, et de structurer la pointe nasale et le dorsum avec des greffes pour maximiser le contour et le soutien.

Autologous gluteal augmentation with parasacral perforator-pedicled propeller flaps

Bekara F, Chaput B, Ciucur E *et al. Plast Reconstr Surg*, 2022;149:1114e-1117e.

Les lambeaux désépithélialisés ont été utilisés dans le remodelage fessier, mais la plupart améliorent la projection dans les quadrants supérieurs. Un lifting circonférentiel du bas du corps avec un lambeau en hélice pédiculé sur des perforantes parasacrées permet d'obtenir une augmentation volumétrique et une projection maximale des fesses au niveau moyen et dans la moitié médiale des fesses.

Entre janvier et décembre 2019, une série de 18 patients a été opérée et évaluée de manière prospective. En postopératoire, le taux de satisfaction a été évalué sur une échelle analogique en 10 points (1 = insatisfait, 10 = très satisfait) par le patient et par deux chirurgiens indépendants à partir de photographies prises 1 an après l'intervention. Deux complications mineures ont été notées, un sérome et deux déhiscences cutanées qui ont guéri sans chirurgie. Le taux de satisfaction évalué par les patients était de 8,3 (± 1,1), et par les chirurgiens de 7,9 et 8,1.

Body feminization combining large-volume fat grafting and gluteal implants

Del Vecchio D, Bravo MG, Mandlik V *et al. Plast Reconstr Surg*, 2022;149:1197-1203.

Le patient transgenre est un patient unique, il nécessite des solutions composites avec implants et lipofilling afin d'avoir de meilleurs résultats en termes de rapport taille/hanches.

36 patients consécutifs ont bénéficié d'une féminisation corporelle en utilisant une greffe de graisse à grand volume avec ou sans implants fessiers. Dans 12 de ces 36 cas, la greffe de graisse a été complétée par la pose intramusculaire d'implants en silicone. Le rapport taille/hanches moyen avant la chirurgie était de 1,11 et il s'est amélioré à 0,81 après la chirurgie (groupe transfert de graisse uniquement : 0,88 ; groupe transfert de graisse avec implants : 0,75).

A systematic review and meta-analysis evaluating the impact of tranexamic acid administration in aesthetic plastic surgery

Laikhter E, Comer CD, Shiah E *et al. Aesthet Surg J*, 2022;42:548-558.

Une revue de la littérature suggère que l'acide tranexamique (ATX) peut améliorer les résultats chez les patients en chirurgie esthétique. Sur 287 articles identifiés, 14 études évaluant l'utilisation de l'ATX dans la rhinoplastie (6), le lifting (3), la liposuccion (3), la plastie mammaire de réduction (1) et la blépharoplastie (1) ont été incluses. L'hétérogénéité des rapports a empêché la méta-analyse, 5 études parmis 7 ont cependant trouvé une diminution significative des niveaux d'ecchymoses postopératoires dans les 7 jours suivant la chirurgie, 3 études ont trouvé des réductions statistiquement significatives du débit de drainage postopératoire et 1 étude a rapporté une amélioration significative de la qualité du site chirurgical pour les patients ayant reçu de l'ATX (p = 0,001).

Influence de l'indice de masse corporelle sur les complications des chirurgies de séquelles d'amaigrissement

Trigano C, Afchain F, Florent V *et al. Ann Chir Plast Esthet*, 2022;67:68-72.

Les chirurgies de séquelles d'amaigrissement peuvent être la source de complications postopératoires et l'obésité résiduelle, définie par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30, est classiquement considérée comme une contre-indication relative.

223 patients ont été inclus dans cette étude, représentant un total de 247 interventions chirurgicales : 124 dans le groupe IMC < 30 (I) et 123 dans le groupe IMC ≥ 30 (II). 16 interventions ont été suivies d'au moins une complication majeure, soit 6 dans le groupe I contre 10 dans le groupe II (RR = 1,7 [0,6-4,5] ; NS ; p = 0,29). Il n'y avait donc pas significativement plus de complications majeures chez les patients obèses. Les auteurs concluent que l'IMC supérieur à 30 n'est pas un critère suffisant pour contre-indiquer ce type de chirurgie.

Total neck rejuvenation, harnessing the platysma in the lower neck and décolletage

Hodgkinson D. *Aesthetic Plast Surg*, 2022; 46:161-172.

Dans le but d'améliorer les résultats du lifting du cou dans le rajeunissement de sa partie inférieure et d'éviter la récidive précoce de la laxité, la technique chirurgicale décrite est inspirée du lifting vertical de Fogli/Labbé. En effet, le lambeau

auriculo-platysmal est individualisé puis fixé par des sutures permanentes sur le fascia de Loré après libération des ligaments d'attache cervicale du platysma.

Sting technique: a new procedure for hypoplasic lower breast poles

Campiglio G, Klinger M, Vinci V. *Aesthetic Plast Surg*, 2022;46:697-703.

Dans l'augmentation mammaire, les patientes atteintes d'hypoplasie des pôles inférieurs constituent un défi difficile pour les chirurgiens plasticiens. Diverses techniques ont été décrites afin de résoudre ce problème : manipulation parenchymateuse, greffe de graisse seule ou après libération sous-cutanée du tissu sténosé (rigotomie). Une nouvelle technique chirurgicale consiste en de multiples piqûres à l'aide d'une aiguille 18 G de la peau et de la glande du segment III associées à un implant pour corriger un pôle inférieur du sein plat, rigide et hypoplasique et éviter un aspect en double contour.

Au total, 24 patientes atteintes de cette malformation ont été traitées avec cette technique. Les résultats esthétiques évalués par le groupe de chirurgiens sur une échelle de 0 (très insatisfaisants) à 10 (très satisfaisants) ont rapporté une valeur moyenne de 7,9, alors que les patients ont rapporté une valeur moyenne de 8,3.

L'auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d'intérêts concernant les données publiées dans cet article.