

## Mises au point interactives – Dermatologie pédiatrique



**D. TENNSTEDT**  
Cabinet de Dermatologie,  
NIVELLES (Belgique).

### Sommes-nous en train de perdre la magie de la clinique en dermatologie ? L'exemple des érythèmes fessiers de l'enfant : un coup d'œil suffit-il ?

**L**es dermatites du siège représentent un problème relativement fréquent de la pathologie dermatologique du nouveau-né, du nourrisson, voire du jeune enfant. Dans la grande majorité des cas, elles apparaissent au niveau de la zone de contact des langes et correspondent le plus souvent à une dermatite d'irritation (dermatite en W) (**fig. 1**).

Cependant, la zone des couches peut également être le siège d'autres affections nettement plus rares : dermatite atopique de localisation atypique se rencontrant la plupart du temps en d'autres endroits du tégument ou affection dont les symptômes au niveau du siège ne sont qu'une indication pour une maladie "systémique" sous-jacente (**fig. 2**).

Il faut également signaler que, dans un certain nombre de cas, une dermatite du siège de nature irritative peut ne pas évoluer selon le modèle classique suite à un traitement bien conduit. Il devient alors indispensable de poser un diagnos-



**Fig. 1 :** Dermatite de contact irritative.



**Fig. 2 :** Dermatite de contact irritative sur Hirschsprung (alternance de constipation et de diarrhée).

tic plus spécifique s'appuyant sur une anamnèse approfondie, une sémiologie fine des lésions cutanées, ainsi qu'une recherche de causes potentielles et en particulier d'une dermatite de contact de nature immunologique.

Il semble essentiel d'essayer, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un diagnostic de "certitude" ou de "quasi-certitude" avant de proposer un traitement plus ou moins spécifique.

Dans la plupart des cas, un "simple coup d'œil" accompagné d'une anamnèse bien conduite suffit ! Cependant, en cas de non-réponse à un traitement logique et bien effectué, il convient de remettre son diagnostic en question, de repenser un "coup d'œil approfondi" et de proposer soit un changement de thérapeutique,

soit des examens complémentaires guidés par la clinique.

#### Dermatites de contact d'origine irritative

La dermatite irritative du siège est l'une des dermatoses les plus fréquentes chez l'enfant et représente une forme non allergique de dermatite de contact de topographie habituellement en "W", caractérisée par une atteinte typique des convexités. Le pic d'incidence se situe essentiellement entre 6 et 12 mois. Il pourrait également exister un pic pendant les 4 premières semaines de la vie (rôle vraisemblable des selles liquides liées à l'allaitement maternel).

Cliniquement, une forme aiguë, érosive, associant vésicules, voire érosions, est décrite ainsi qu'une forme chronique, sèche, voire parfois hyperkératosique. Le respect du fond des plis est caractéristique bien que ceux-ci puissent être secondairement atteints (en particulier en cas de colonisation "massive") par le *Candida*. Dans ce dernier cas, il existe fréquemment une desquamation et de petites papulo-pustules périphériques.

Cette affection fréquente semble d'origine mécanique et est essentiellement liée à la macération, à l'humidité et à la présence d'urines et de selles plus ou moins corrosives. La température locale jouerait également un rôle. L'hydratation excessive liée à la macération par les urines, l'occlusion et le frottement avec le linge jouent un rôle essentiel.

L'humidité ambiante agit sur la perméabilité au niveau de la couche cornée.

Le rôle des selles est également essentiel quant à la présence d'enzymes (protéases et lipases d'origine pancréatique) et de sels biliaires. Les lipases agissent sur la couche cornée et les protéases sur les kératinocytes. Les sels biliaires, quant à eux, sont essentiellement irritants. Cette activité est en général augmentée dès qu'il existe une diarrhée, ce qui peut précipiter l'apparition d'un érythème fessier de nature irritative.

Par ailleurs, lorsque les urines entrent en contact avec les selles, les uréases liées aux bactéries fécales peuvent dégrader l'urée contenue dans les urines et engendrer la formation d'ammoniaque. Ce dernier contribue à l'augmentation du pH, ce qui favoriserait l'activité des protéases et des lipases fécales. Dans certains cas, l'utilisation de savons alcalins fait également augmenter le pH.

Il faut cependant reconnaître qu'à l'heure actuelle la fréquence et la sévérité de l'érythème fessier du nourrisson seraient plutôt en diminution. Cela est vraisemblablement lié à l'avènement des couches jetables et à l'abandon des culottes caoutchoutées ou plastifiées. De nos jours, les couches "très absorbantes" ou "micro-aérées" diminuent nettement l'humidité locale, et donc le contact direct des urines et dans une moindre mesure des selles avec la peau.

Cependant, de nouvelles tendances voient le jour avec une "réhabilitation" progressive des couches en tissu lavables (et ce, essentiellement pour des raisons écologiques voire économiques !). Or, les couches lavables causent un problème hygiénique dû au lavage à température relativement basse (30-40°) et parfois à des rajouts de produits divers afin d'atténuer les mauvaises odeurs persistantes (liées au fait que les couches ne sont pas systématiquement lavées au jour le jour). Il n'est pas exceptionnel que divers produits

soient utilisés pour pallier cet inconvénient (parfums ou huiles essentielles).

Une candidose soit primaire, soit compliquant une dermatite irritative peut s'observer. L'atteinte des fonds des plis est assez systématique. En périphérie, il existe souvent de petites lésions satellites avec bordure desquamative (**fig. 3**).

Le granulome glutéal infantile (**fig. 4**) et la dermatite papulo-érosive de Sevestre et Jacquet (**fig. 5**) ne sont en fait que deux variantes de la dermatite irritative du siège. Il s'agit en général de multiples papulo-nodules bien délimi-



**Fig. 3 :** Candidose du siège.



**Fig. 4 :** Granulome glutéal infantile.



**Fig. 5 :** Dermatite de Sevestre et Jacquet.



**Fig. 6 :** Dermatite pigmentaire et hyperkératosique.

tés, de coloration rouge vif, curieusement relativement asymptomatiques et d'étiologie incertaine. Plusieurs facteurs favoriseraient ces affections : utilisation de corticoïdes topiques, surinfection par *Candida albicans* ou encore dermatite d'irritation chronique liée à des selles fréquentes et très liquides ou à des changes insuffisants en fréquence.

## Mises au point interactives – Dermatologie pédiatrique



**Fig. 7 :** Parakératose granulaire infantile.

La dermatite pigmentaire et hyperkératosique des “langes” est une variété plus rare et serait liée à un usage excessif de détergents à pH acide : taches brunes légèrement hyperkératosiques et papyracées du fond des plis (**fig. 6**).

La parakératose granulaire infantile serait nettement plus exceptionnelle et correspondrait à un déficit de la transformation de la profilaggrine en filaggrine. Plusieurs facteurs entreraient en ligne de compte (augmentation de la température, humidité, facteurs frictionnels et utilisation abusive de multiples topiques pour la toilette) : maculo-papules kératosiques, réticulées et hyperpigmentées des plis inguinaux, des fesses et des plis de l'abdomen. Le prurit serait inexistant. L'évolution est spontanément favorable entre 1 et 12 mois (**fig. 7**).

### Dermatites de contact d'origine allergique

La dermatite allergique de contact du siège est nettement moins fréquente et se présente comme un classique eczéma de contact (avec érythème et vésicules accompagnées d'un prurit important). Cependant, la clinique est parfois très trompeuse et peut se rapprocher de celle de la dermatite d'irritation (**fig. 8 et 9**).

La dermatite allergique de contact peut survenir soit *de novo*, soit comme complication d'un autre type de dermatite du siège et en particulier une dermatite de contact irritative. Il faut y penser sys-



**Fig. 8 :** Dermatitis allergique de contact liée à une lingette nettoyante contenant des parfums.

tématiquement lorsque l'affection ne répond pas à un traitement qui semble approprié et suivi.

Une mise au point par tests épicutanés est hautement souhaitable mais n'est pas toujours indispensable car le retrait de l'allergène incriminé permet le diagnostic de quasi-certitude (un “rechallenge test” peut éventuellement être proposé). Les principaux allergènes sont liés à l'utilisation de topiques médicamenteux, de lingettes humides, de produits de soin, voire de parfums ou encore de dérivés du caoutchouc contenu dans les couches elles-mêmes (même si cela

devient nettement plus exceptionnel). En revanche, les lingettes humides utilisées par les parents dans le but de simplifier le change de leur enfant contiennent très souvent de multiples allergènes potentiels : parfums, conservateurs. Les dérivés des isothiazolinones font partie des allergènes importants pouvant affecter non seulement la peau du siège des jeunes enfants mais également les mains de celui ou celle qui les utilise pour changer l'enfant.

### Mesures de prévention

Dans la plupart des cas, de simples mesures de prévention sont suffisantes. Il convient d'éviter la macération en pratiquant des changes fréquents suivis d'un séchage soigneux (toutes les 60 à 120 minutes chez les nouveau-nés et au minimum toutes les 4 heures chez le nourrisson). L'utilisation de couches en tissu devrait être “proscrite” car elles sont nettement moins absorbantes. En ce qui concerne les couches dites “super-absorbantes” ou “micro-aérées”, elles ne sont essentiellement efficaces que face



**Fig. 9 :** Test épicutané positif à un ingrédient contenu dans une lingette nettoyante : alpha hexyl cinnamal.

aux urines car, en raison de leur teneur importante en polyacrylates, elles seraient nettement plus occlusives.

En général, les savons irritants ou nettement alcalins doivent être évités. La plupart du temps, un rinçage à l'eau tiède est suffisant (surtout lorsqu'il n'y a que des urines dans le linge). L'utilisation d'un savon surgras, voire d'un lait de toilette non parfumé, est à recommander. L'emploi de lingettes humides devrait

être restreint et systématiquement suivi d'un rinçage minutieux. Un séchage délicat doit toujours être conseillé.

L'application de pâte à l'oxyde de zinc ou de pâte contenant du dioxyde de titane peut être recommandée (voire des crèmes barrières). Cette application doit être systématique lors de chaque change. L'emploi de produits parfumés doit toujours être proscrit. L'utilisation de talc reste controversée.

En cas de besoin, le traitement de la surinfection candidosique éventuelle ne doit pas être oublié (azolé ou ciclopirox olamine en pâte ou en crème).

---

L'auteur a déclaré ne pas avoir de liens d'intérêts concernant les données publiées dans cet article.